Único hierro inyectable en vacuno en España

Belfer™ 100 mg/ml

Hierro (III) en solución inyectable

Para la prevención y tratamiento de anémias

- 1 de cada 5 terneros presenta déficit de hierro al nacer

Indispensable en el botiquín veterinario

- Incrementar la resistencia a enfermedades microbianas y parasitarias
- Incrementar la resistencia durante la gestación y convalecencias

Nueva formulación

- Excelente tolerancia en el lugar de la inyección[1]

LABIANA

siempre eficaz

Belfer™ 100 mg/ml Hierro (III) en solución inyectable

Los terneros al nacer presentan bajos niveles de hierro

Terneros de razas lecheras no retienen hierro durante el desarrollo fetal



Déficit de hierro en el periodo postnatal

Pérdida de hierro desde el nacimiento[2]



COMPOSICIÓN POR ML
Hierro (III) en forma de complejo de hidróxido de hierro (III) dextrano .....100 mg

INDICACIONES
Para el tratamiento de la falta de hierro y la anemia por falta de hierro.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ternero: 10 - 30 mg de hierro III/kg p.v., (equivalente a 0,1 - 0,3 ml/kg p.v. de belfer) vía intramuscular o subcutánea.
Bovino: 1 mg de hierro III/kg p.v., (equivalente a 1 ml/p.v. de belfer) vía intramuscular.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: cero días.
Leche: cero días.

CONTRAINDICACIONES
- No usar en animales que padezcan una enfermedad infecciosa, especialmente diarrea.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

PRECAUCIONES ESPECIALES
Para administración única. Si es necesario, se puede administrar una segunda inyección 8 - 10 días después del primer tratamiento.
No inyectar más de 10 ml de Belfer por zona de inyección.
Al tratar grupos de animales de una sola vez, usar una jeringa multidosis para evitar tener que abrir el tapón demasiadas veces.

REACCIONES ADVERSAS
En muy raras ocasiones, la inyección de hierro dextrano podría provocar hipersensibilidad, o incluso reacciones anafilácticas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación.
Proteger de la luz.

PERIODO DE VALIDEZ
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.
Período de validez después de abierto el envase primario: 14 días.

PRESENTACIÓN
Viales de 100 ml.

Registro nº 3621 ESP

Titular de la autorización de comercialización:
bela-pharm GmbH & Co.KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Alemania

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Referencias

[1] Pilot Study to compare the Efficacy and Tolerance of two formulations of Bela-Fer-Dextran in Bovines (Calves) after subcutaneous and intramuscular administration, Harlan Laboratories Bioservice, 2008.

[2] Bostedt, H. et al. (1990) Zur Entwicklung der Eisen- und Kupferkonzen- tration im Blutplasma von Kälbern in den ersten Lebenstagen undwochen, gleichzeitig ein Beitrag zur larvierten neonatalen Eisenmangelanämie Deutsche tierärztliche Wochenschrift 97, p. 377 - 440.

LABIANA
siempre eficaz

Mayo 2020

Labiana Life Sciences S.A. - C/ Venus, 26 - 08228 Terrassa - Barcelona - España - Teléfono: +34 937 36 97 00 - www.labiana.com