

LABHIDRO® AD3E SOLUCIÓN INYECTABLE

COMPOSICIÓN

Vitamina A (propionato de retinol), 500.000 UI.
Colecalciferol (vitamina D3), 75.000 UI.
Acetato de todo-rac- α -tocoferilo (vitamina E), 50 mg.
Excipientes: Alcohol bencílico (E 1519), 25 mg.
Todo-rac- α -tocoferol (E 307), 0,5 mg.
Dicaprilcaprato de propilenglicol.

INDICACIONES

- En todas las especies, tratamiento y prevención de deficiencia de vitaminas A, D3 y E.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

POSOLOGÍA

Bovino: 1-5 ml de medicamento/animal, en dosis única.

Porcino: 0,5-3 ml de medicamento/animal, en dosis única.

Caballos: 1-5 ml de medicamento/animal, en dosis única.

Ovino: 0,5-2 ml de medicamento/ animal, en dosis única.

La administración de dosis elevadas y/o durante periodos prolongados de vitaminas liposolubles puede provocar estados de toxicidad conocidos como hipervitaminosis.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.

Leche: Cero días.

PRECAUCIONES Y REACCIONES ADVERSAS

- En muy raras ocasiones pueden producirse reacciones alérgicas.
- En muy raras ocasiones puede aparecer una pequeña reacción local en el punto de la inyección, que desaparece después de un tiempo breve.
- No utilizar este medicamento durante la gestación.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

PRESENTACIONES

Caja con 1 vial de 100 ml.

Registro nº 3668 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

